

Eksempeloppgåve/ Eksempeloppgave

Desember 2007

REA3022 Matematikk R1
Programfag

Del 1

Oppgave 1

a) Deriver funksjonene

1) $f(x) = x \cdot \ln x$

2) $g(x) = 3e^{x^2+1}$

b) Bestem følgende grenseverdi, dersom den eksisterer:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + 2x - 3}{x - 1}$$

c) En funksjon f er kontinuert, men ikke deriverbar i punktet $(1, 2)$. Tegn en skisse av grafen til en mulig funksjon f .

d) Finn de eksakte løsningene av likningene

1) $2 \ln x - 4 = 0$

2) $e^{2x} - 3e^x + 2 = 0$

e) Skriv så enkelt som mulig

1) $\frac{2^{-4} \cdot 2^3}{2^{-2}}$

2) $\frac{\sqrt{a} \cdot (ab^2)^{\frac{1}{3}} \cdot b}{(a^2b)^2 \cdot b^{-\frac{1}{3}}}$


- f) Vi har gitt en trekant ABC . Punktet D ligger på AB , punktet E ligger på BC , og punktet F ligger på AC . Se figuren.

Cevas setning sier:

Linjestykkene AE , BF og CD skjærer hverandre i ett punkt hvis og bare hvis

$$\frac{AD}{DB} \cdot \frac{BE}{EC} \cdot \frac{CF}{FA} = 1$$

Bruk Cevas setning til å bevise at medianene i en trekant skjærer hverandre i ett punkt.



Oppgave 2

- a) Vis at polynomet $f(x) = x^3 - 6x^2 + 11x - 6$ er delelig med $x - 2$.
- b) Skriv $f(x)$ som et produkt av førstegradsfaktorer.
- c) Løs ulikheten $\frac{x^3 - 6x^2 + 11x - 6}{x^2 - 9} > 0$.
- d) Bestem a slik at likningen $x^3 - 2x^2 - 5x + a = 0$ får en løsning lik 1. Løs likningen for denne verdien av a .

Del 2

Oppgave 3

På en skole er det 55 % jenter og 45 % gutter på Vg2. Av jentene har 25 % valgt matematikk R1. Av guttene har 30 % valgt R1.

- Formuler de to siste opplysningene i teksten ovenfor som betingede sannsynligheter.
- Bestem sannsynligheten for at en tilfeldig valgt elev er en gutt som har valgt R1.
- Bestem sannsynligheten for at en tilfeldig valgt elev har valgt R1.

Av alle elevene på Vg2 har 30 % valgt fysikk. Blant dem som har valgt R1, er det 80 % som har valgt fysikk.

- Bestem sannsynligheten for at en tilfeldig valgt fysikkelev har valgt R1.

Oppgave 4

*Du skal besvare enten alternativ I eller alternativ II.
De to alternativene er likeverdige ved vurderingen.*

*(Dersom besvarelsen inneholder deler av begge,
vil bare det du har skrevet på alternativ I, bli vurdert.)*

Alternativ I

En partikkel beveger seg i planet. Posisjonen til partikkelen ved tiden t er gitt ved

$$\vec{r}(t) = [t^2, t^3 - 3t] \text{ der } t \in [0, 2]$$

- Tegn grafen som beskriver bevegelsen til partikkelen.
- Bestem ved regning koordinatene til skjæringspunktene mellom grafen og koordinataksene.
- Finn et uttrykk for fartsvektoren \vec{v} . Hva er t når $|\vec{v}(t)| = 3$?
- Bestem koordinatene til de punktene på kurven der fartsvektoren er parallell med koordinataksene.
- Bestem koordinatene til det punktet der farten er minst.

Alternativ II

I denne oppgaven kan det være naturlig å bruke dynamisk programvare, men oppgaven kan også løses ved å bruke grafisk lommeregner. I løsningen av oppgaven vil det være aktuelt å skissere flere grafer.

a) Tegn grafen til funksjonen $f(x) = \frac{1}{x}$, $x > 0$.

Tangenten til grafen i punktet $(a, f(a))$ skjærer x -aksen i punktet A og y -aksen i punktet B . Punktet O er origo.

b) Bestem arealet av $\triangle OAB$ for $a = 2$ enten grafisk eller ved regning.

c) Gjenta det du gjorde i b) for $a = \frac{1}{2}$ og $a = 3$. Kommenter svarene.

Vi skal nå studere størrelsen av arealet av $\triangle OAB$ analytisk.

d) Bestem $f'(x)$. Finn likningen for tangenten til funksjonen f i punktet $(a, f(a))$.


e) Bestem koordinatene til skjæringspunktene A og B mellom tangenten og koordinataksene. Hva blir arealet av $\triangle OAB$?

Oppgave 5



Bildet til venstre viser to baller som ligger inntil hverandre. Ballene har radiene R og r . Berøringspunktet mellom ballene og bordet kalles henholdsvis A og B . Berøringspunktet mellom ballene kalles C .

I denne oppgaven skal vi undersøke egenskaper ved $\triangle ABC$.



Figur 1

Figur 1 til venstre viser et snitt gjennom sentrene i ballene, M og N .

a) Forklar at $\angle BAM = \angle NBA = 90^\circ$, og at $\angle MNB = 180^\circ - \angle AMC$.

b) Vis at $AB = 2\sqrt{Rr}$. (Tips: Bruk Pythagoras' setning.)

Vi setter $\angle AMC = v$, $\angle BCN = u$ og $\angle ACM = w$.

c) Vis at $u + w = 90^\circ$, og at $\angle ACB = 90^\circ$.

I resten av oppgaven ser vi på to andre sirkler med $R = 4$ cm og $r = 1$ cm.

d) Bruk b) til å finne lengden av AB .

e) Konstruer med passer og linjal figur 1 med $R = 4$ cm og $r = 1$ cm. Skriv en forklaring til konstruksjonen.

f) Slå en halvsirkel med AB som diameter. Forklar hvorfor denne halvsirkelen går gjennom C .